

**Innhold:**

- Fokus på ugrasbekjempelse i rødkløvergjenlegg
- Soppbehandling?
- Stort behov for vekstregulering i de fleste arter
- Ikke fått sådd gjenlegget?

**Til alle frøavlere**

Det har vært en lang og kald vår. De fleste enger ser fine ut og vi forventer gode avlinger av timotei med slikt vær. I kløverengene har balderbråen rukket å vokse seg stor, da det ikke har vært gode nok sprøyteforhold for Basagran SG.

**Fokus på ugrasbekjempelse i rødkløvergjenlegg**

Vi ser at det er store mengder stor balderbrå i enkelte rødkløverfrøenger. Dette er et tilbakevendende problem. Til nå har det vært i kaldeste laget for bruk av Basagran SG. I tillegg er det varierte erfaringer med effekten. Mange

velger derfor å heller satse på lusing av balderbrå i rødkløverenga, selv om det er kostbart. Det kan derfor være en god strategi å ha fokus på ugrasbekjempelse i gjenlegget, for å redusere mengden balderbrå spesielt. I rødkløvergjenlegg har vi ikke store valgmuligheter.

Det er kun Basagran M75 eller 0,75 g Express SX + 50 ml MCPA (Off-label) som er mulig inntil videre.

Basagran M75 er vesentlig mer effektivt enn sin navnebror Basagran SG, pga tilsats av MCPA. Hvilket middel som bør velges avhenger av ugrasfloraen. Begge midler er ganske gode på balderbrå, men Express kan benyttes ved lavere temperatur enn Basagran M75. Og sprøyting på lite ugras er som kjent effektivt. Har du mye då, meldestokk, rødtvetann eller vassarve bør du velge Express. Dersom det er

gullkrage, haremat, linbendel, klengemaure eller tranehals er Basagran M75 et bedre valg. Ved bruk av Express i rødkløvergjenlegg er det noe fare for skader, men trolig ikke avlingsreducerende. Det er viktig å tilsette MCPA til Expressen, da den gjør virkningen noe mildere, og skaden blir mindre. Express + klebemiddel gir større skader på kløveren. Vi kommer til å jobbe videre med andre muligheter for å bekjempe balderbråen fremover, vi har muligens noen andre muligheter i ermet.

**Stort behov for vekstregulering i de fleste arter**

På grunn av de våte forholdene vi har hatt nå i vår er mange enger blitt svært tette, og har stort behov for vekstregulering. Antagelig utover standard doser. Timotei har hatt nærmest ideelle forhold med en varm april og en kald mai-juni, så der kan man forvente store avlinger dersom resten av sesongen blir bra. Ta hensyn til dette fremover i alle arter. Moddus M kan benyttes i alle arter, unntatt i strandrør, sauesvingel og hvitkløver, der vekstregulering er uaktuelt. Delt behandling er bedre enn én stor dose. Generelt bør man også være forsiktig med store doser på sent tidspunkt, da det kan oppstå problemer med å få akset til å komme ut av slira.

## Soppbehandling?

Siste uken er det oppstått en god del sopp i engrapp, bladfaks og engsvingel, spesielt i 1.års eng faktisk. Acanto Prima har en generell off-label godkjennelse i alle grasarter. I timotei og engsvingel kan også det

benyttes Stereo off-label. I strandrør, rødsvingel, sauesvingel og engrapp er det søkt om Delaro off-label-godkjent, men foreløpig ingen svar fra Mattilsynet.

Soppbehandling kan være lønnsomt, i hvert fall der man tydelig ser sopp i enga. De arter hvor vi har sett positive utslag for vår/sommersprøyting med soppmiddel er først og fremst engsvingel, timotei og engrapp. Husk at Stereo/Delaro + Moddus i tankblanding gir en ekstra stråforkortende effekt, så reduser dosen Moddus ca 20 % i forhold til opprinnelig tiltenkt

Moddusdose. Men husk at vekstreguleringsbehovet er stort i år!



Bladflekk i bladfaks Leif

## Ikke fått sådd gjenlegget?

Noen har kommet litt i klemma, da dekkeveksten er sådd uten at man har fått værforhold til å så gjenlegget. Det har da vært spørsmål om å høstså etter tresking av «dekkveksten». De fleste av artene som er beregnet sådd med dekkvekst har så langt krav til veksttid før høsten inntreer at dette vil være uaktuelt. Det er mulig å så timotei til midten av august og muligens kan det være aktuelt i raigras, men de andre artene vil dette være høyst risikabelt. Dersom plantene ikke får lang nok tid på vekst før vinteren inntreer risikerer man et helt år uten frøbærende stengler, og heller ingen inntekt fra dekkvekst.

Hilsen fra

|                     |   |
|---------------------|---|
| Erik Aaberg         | Norsk Landbruksrådgiving Oppland        |
| Jørn Ketil Brønstad | Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag |
| Silja Valand        | Norsk Landbruksrådgiving Østafjells     |
| John Ingar Øverland | Norsk Landbruksrådgiving Viken          |
| Trond Gunnarstorp   | Norsk Landbruksrådgiving Sørøst         |
| Astrid Gissingen    | Norsk Landbruksrådgiving Agder          |
| Stein Jørgensen     | Hedmark Landbruksrådgiving              |