


INNHold:



















- Vær og vekst
- Når blir det tresking?
- Ta vare på frøhalmen
- Markdag Hedmark og Oppland

Vær og vekst

Etter to dager på Borgeby Feltdager i Skåne er det et tema som går igjen: Konsekvens av varme og tørke. Bønder snakker om det. Det gjør også rådgivere, firmafolk og folk fra forvaltningen. Utfordringen blir større for hver dag som går. For frø er løpet kjørt etter blomstring, så vatning vil ikke gjøre noe med frøveksten heretter. Men noen stikkord i en slik ekstrem tørkesesong vil være nyttig å ha i mente:

- Små frø betyr mindre avling selv om antall frø skulle bli normalt
- Tørken gir smått og lett frø, noe som vil kunne gi større tap på tresker og i rensing
- Smått frø gjelder i prinsippet alle grasfrøarter
- Varme og tørke gir kortere tid mellom skyting, modning og overmodning (dryssing)
- Tresking starter nå i helga, strandrør og sauesvingel
- NB: Følg med i engene – eks: tørkesterk vs. tørkesvak og ny vs. eldre eng



Lørdag 30. juni 12-18	Søndag 1. juli 12-18	Mandag 2. juli 14-20	Tirsdag 3. juli 14-20	Onsdag 4. juli 14-20	Torsdag 5. juli 14-20	Fredag 6. juli 14-20	Lørdag 7. juli 14-20	Søndag 8. juli 14-20
								
14°	19°	27°	27°	28°	29°	30°	30°	30°
0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
								

Figur: Langtidsvarsel for Apelsvoll – ikke en dråpe i sikte og fortsatt høye temperaturer

Bilde: Timotei som har gitt opp halve akset/ kjevlet. Steriliteten vises som avfarging/ hvit farge.

Foto: Harald Solberg

Når blir det tresking?

Vi gjengir tabellen fra sist uke. Som nevnt over vil tresking starte i helga. Engene er så modne at de dryser allerede. Dette skyldes den varme og tørre perioden vi har bak oss.

Med været som er varslet vil det gå kortere tid enn tabellen indikerer. Følg derfor jevnlig med i de ulike engene. For de som har tidlige arter og sorter er det viktig å forberede treskeren i tide og flere har kort tid til dette arbeidet. Som skrevet i sist melding vil ulike svingelarter og hundegras være klare til høsting 8-9. juli, med normal temperatur. Forvent derfor tresking av disse noen dager tidligere sør på Østlandet og noen dager seinere nord på Østlandet.

Art	Fra skyting til blomstring	Fra blomstring til:	
		Skårlegging	Direkte-tresking
Timotei	19	35	43
Flerårig raigras	15	33 (30-37)	40-45
Engsvingel	15	22-25	28-32
Rødsvingel	21	25	32-35
Hundegras	21	25-28	32-35
Engrapp	16	25-33	35-40
Engkvein		21(?)	
Hvitkløver		23-28 (nedsviing)	
Rødkløver		30-35 (nedsviing)	42-50

Vi (Vestfold) har notert full blomstring i noen engar i år, og får da følgende forventede treskedato:

Art	Blomstring	Tresking
Timotei:	16. juni	29. juli
Engsvingel:	8. juni	8. juli
Rødsvingel:	5. juni	9. juli
Hundegras:	5. juni	9. juli
Engrapp:	6. juni	14. juli

Hvitkløveren er i full blomst nå, og svis ned om 3-4 uker

Fôr fra frøarealer

Det meldes om avlinger på førsteslått på 25-60% av normalen, i volum. I tillegg har gjenveksten stoppet helt opp, noe som gir store bekymringer for videre slåtter. Selv om vatning prioriteres til grasen gir temperaturen manglende effekt.

NLR Viken har lagt ut en artikkel om viktigheten av å berge frøhalmen et år der det blir stort underskudd på grovfôr i hele Norden og Baltikum. Artikkelen finner du [her](#)

Markdag Hedmark og Oppland Frødyrkerlag

Tirsdag denne uka inviterte frødyrkerlaget til markdag hos Jens Kihle på Toten. De dyrker rødkløversorten Gandalf for Felleskjøpet. Arealet var vatnet 2 ganger og stod fortsatt veldig bra. Noe ujevn blomstring mente de frammøtte kunne skyldes vanskelige innhøstingsforhold. Det så imidlertid ut som kløverplantene var forsinket og at blomstringen ville komme også i sporene. Tiltak og forhåpninger var hovedsak for markvandringen. Så langt vi kunne se, så kløveren ut til å ha taklet varmen godt og kombinasjonen solid rot og vatning ga frodige planter med fine blomsterhoder.



Eli Åsen, som tidligere har jobbet i Norsk Birøkerlag fortalte om biers – og humlers arbeid og hvordan de er nyttige i mange kulturer.

Bilde 1: Markvandring hos Jens Kihle, Toten. Gandalfåkeren stod bra takket være flere vatninger.

Bilde 2: Kløverhodene hadde godt med frø. Enkelte hoder var avblomstret, mens de siste ikke var kommet fram ennå.

Begge: Harald Solberg



Siste frist for såing av noen arter:

Sauesvingel 15. juni, rødsvingel og engrapp 20. juni, bladfaks 15. juli og strandrør 1.juli. Siste frist betyr ikke at det er like greit som å så tidligere, store planter om høsten er avgjørende for avling i førsteårsenga.

Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells	900 89 399
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken	958 80 143
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Øst	481 63 082
Astrid Gissingen	Norsk Landbruksrådgiving Agder	917 63 115
Harald Solberg	Norsk Landbruksrådgiving Innlandet	957 69 860